

Date de mise en œuvre et lots supplémentaires
2010

Pourcentage du paquet couvert

Les mises en garde sanitaires doivent impérativement couvrir 33 % de l'avant et 33 % du dos des paquets. En tout, 33 % de la surface externe du paquet sont réservés aux mises en garde sanitaires.

Calendrier de rotation et historique

Six mises en garde sanitaires sont utilisées sur les paquets de cigarettes.

Restrictions relatives aux informations trompeuses

Non précisé.

ÉTIQUETTES DE MISE EN GARDE

2010



АНХААРУУЛГА
ТАМХИ ҮР УДМЫГ ХӨНӨӨНӨ.
Цусан хангамж буурч хүчилтөрөгч, тэжээл дутагдсанаас ургийн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлдэг.



АНХААРУУЛГА
ТАМХИ УРУУЛ, АМНЫ ХӨНДИЙН ХАВДАР, БУЙЛНЫ ӨВЧИН, ШҮДГҮЙДЭХ ШАЛТГААН БОЛНО.
Буйл үрэвсэж шүд сулран шүдгүйднэ.



АНХААРУУЛГА
ТАМХИ ЗҮРХНИЙ ШИГДЭЭС ҮҮСГЭНЭ.
Цусны хүчилтөрөгчийн хангамж багассанаас эрхтнүүдэд тэжээл дутагдаж зүрх, тархины шигдээс үүсгэдэг.

Тамхичны зүрх Эрүүл зүрх



АНХААРУУЛГА
ТАМХИ ЧИХРИЙН ШИЖИНГ ХҮНДРҮҮЛНЭ.
Захын болон төвийн судасны бөглөрлийг үүсгэж, хөл тайрах, хараагүй болох эрсдэлийг нэмэгдүүлнэ.



АНХААРУУЛГА
УУШГИНЫ ХАВДРЫН 90% НЬ ТАМХИНААС ҮҮДЭЛТЭЙ.
Уушгины хавдартай 10 хүн тутмын 9 нь тамхичин байдаг.

Тамхичны уушги Эрүүл уушги



АНХААРУУЛГА
ТАМХИ БЭЛГИЙН СУЛРАЛ ҮҮСГЭНЭ.
Бэлэг эрхтний цусан хангамжийг бууруулдаг.